

دستور العمل فنی و توصیه های ترویجی ،... موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- بخش تحقیقات باغبانی

ناصر جلیلود

دستور العمل فنی - ترویجی آفات انگور

عنوان	شرح دستورالعمل و توصیه های کلی		ملاحظات
فصل	عملیات اصلی	عملیات تکمیلی	توضیحات
بهار	۱- زنجیره مو ۱-۱- پاییل کردن اطراف بوته های مواز نیمه دوم اردیبهشت تا پایان خرداد ۱-۲- هرس سبز سالیانه در مرحله عدسی شدن حبه ها ( بعد از تخم ریزی حشره کامل) ۱-۳- حذف علف های هرز باغ	سمپاشی با گرانول دورسبان به میزان ۴۰ کیلو در هکتار در اواخر خرداد همزمان با خروج پوره های سن آخر از خاک ( یا گرانول دیازینون، یا گرانول فورادان).	همزمان با خروج پوره های سن آخر
	۲- خوشه خوار انگور ۲-۱- هرس سبز سالیانه به منظور جلوگیری از ازدیاد شاخه های اضافی	سمپاشی با سم لاروین ۲ در هزار	سمپاشی ها ( برای نسل های ۱ و ۲، ۳) مطابق اطلاعیه های پیش آگاهی حفظ نباتات انجام گیرد.
بهار	۳- کرم سفید ریشه ۳-۱- جمع آوری حشرات کامل در باغ از اوایل خرداد تا اواخر شهریور و از بین بردن آنها با استفاده از تله نورانی ۳-۲- مطابق بند ۱-۱- مبارزه با زنجیره مو ۳-۳- حذف علفهای هرز باغ ۴- تریپس ۴-۱- رعایت بهداشت باغ و تقویت عمومی ۵- شپشک آرد آلوده ۵-۱- رعایت بهداشت و تقویت بوته ها	استفاده از سموم فسفره در مرحله باز شدن جوانه ها تا رشد اولیه برگها ( در صورت وجود آلودگی)	-

		ریختن ۱۰ لیتر محلول سمی دیازینون ۲ در هزار پای بوته های آلوده در اواسط تابستان	زنجره مو ادامه هرس شاخه های آلوده به تخم در اوایل تابستان	
	مطابق اطلاعیه های پیش آگاهی حفظ نباتات انجام گیرد.	سمپاشی علیه نسل سوم آفت سم لاروین ۲ در هزار	۲- خوشه خوار/انگور ۳- کرم سفید ریشه سمپاشی اطراف بوته ها با گرانول دورسبان یا دیازینون به میزان ۴۰ کیلو در هکتار یا امولسیون ۲۰ درصد دیازینون به میزان ۲۰ لیتر در هکتار	تابستان
		-	شپشک آرد آلود مو مبارزه با سم گوزاتیون ۲۰ درصد به نسبت ۲/۵ در هزار به صورت موضعی فقط روی بوته های آلوده در صورت عدم تاثیر مبارزه بهاره	
		-	-	پاییز
		-	۱- زنجره مو ۱-۱- شخم عمیق در زمستان آن یخ آب زمستانه	زمستان
		-	۲- خوشه خوار انگور ۲-۱- یخ آب زمستانه	
		-	۳- شپشک آرد آلود مو	
		سمپاشی بوته های الوده با روغن ولک ۲ درصد بهمراه اتیون ۲ در هزار		